

FAFA55, HT2019

Föreläsning 15, läsvecka 6

9 december 2019

Periodiska systemet: Halvledare (och isolator)

Kvanttal:

$n = 1$

$n = 2$

$n = 3$

$n = 4$

III IV V

hydrogen 1 H 1.0079																	helium 2 He 4.0026						
lithium 3 Li 6.941	beryllium 4 Be 9.0122																	boron 5 B 10.811	carbon 6 C 12.011	nitrogen 7 N 14.007	oxygen 8 O 15.999	fluorine 9 F 18.998	neon 10 Ne 20.180
sodium 11 Na 22.990	magnesium 12 Mg 24.305																	aluminium 13 Al 26.982	silicon 14 Si 28.086	phosphorus 15 P 30.974	sulfur 16 S 32.065	chlorine 17 Cl 35.453	argon 18 Ar 39.948
potassium 19 K 39.098	calcium 20 Ca 40.078	scandium 21 Sc 44.956	titanium 22 Ti 47.867	vanadium 23 V 50.942	chromium 24 Cr 51.996	manganese 25 Mn 54.938	iron 26 Fe 55.845	cobalt 27 Co 58.933	nickel 28 Ni 58.693	copper 29 Cu 63.546	zinc 30 Zn 65.39	gallium 31 Ga 69.723	germanium 32 Ge 72.61	arsenic 33 As 74.922	selenium 34 Se 78.96	bromine 35 Br 79.904	krypton 36 Kr 83.80						
rubidium 37 Rb 85.468	strontium 38 Sr 87.62	yttrium 39 Y 88.906	zirconium 40 Zr 91.224	niobium 41 Nb 92.906	molybdenum 42 Mo 95.94	technetium 43 Tc [98]	ruthenium 44 Ru 101.07	rhodium 45 Rh 102.91	palladium 46 Pd 106.42	silver 47 Ag 107.87	cadmium 48 Cd 112.41	indium 49 In 114.82	tin 50 Sn 118.71	antimony 51 Sb 121.76	tellurium 52 Te 127.60	iodine 53 I 126.90	xenon 54 Xe 131.29						
caesium 55 Cs 132.91	barium 56 Ba 137.33	57-70 *	lutetium 71 Lu 174.97	hafnium 72 Hf 178.49	tantalum 73 Ta 180.95	tungsten 74 W 183.84	rhenium 75 Re 186.21	osmium 76 Os 190.23	iridium 77 Ir 192.22	platinum 78 Pt 195.08	gold 79 Au 196.97	mercury 80 Hg 200.59	thallium 81 Tl 204.38	lead 82 Pb 207.2	bismuth 83 Bi 208.98	polonium 84 Po [209]	astatine 85 At [210]	radon 86 Rn [222]					
francium 87 Fr [223]	radium 88 Ra [226]	89-102 * *	lawrencium 103 Lr [262]	rutherfordium 104 Rf [261]	dubnium 105 Db [262]	seaborgium 106 Sg [266]	bohrium 107 Bh [264]	hassium 108 Hs [269]	meitnerium 109 Mt [268]	ununnilium 110 Uun [271]	unununium 111 Uuu [272]	ununbium 112 Uub [277]		ununquadium 114 Uuq [289]									

* Lanthanide series

lanthanum 57 La 138.91	cerium 58 Ce 140.12	praseodymium 59 Pr 140.91	neodymium 60 Nd 144.24	promethium 61 Pm [145]	samarium 62 Sm 150.36	europium 63 Eu 151.96	gadolinium 64 Gd 157.25	terbium 65 Tb 158.93	dysprosium 66 Dy 162.50	holmium 67 Ho 164.93	erbium 68 Er 167.26	thulium 69 Tm 168.93	ytterbium 70 Yb 173.04
actinium 89 Ac [227]	thorium 90 Th 232.04	protactinium 91 Pa 231.04	uranium 92 U 238.03	neptunium 93 Np [237]	plutonium 94 Pu [244]	americium 95 Am [243]	curium 96 Cm [247]	berkelium 97 Bk [247]	californium 98 Cf [251]	einsteinium 99 Es [252]	fermium 100 Fm [257]	mendelevium 101 Md [258]	nobelium 102 No [259]

** Actinide series

III-V halvledare

Om vi tar hälften av atomer från grupp III och den andra hälften från grupp IV, finns det 4 elektroner per atom i genomsnitt

⇒ Valensband fullt och ledningsband tomt.

⇒ Bra sätt att få **många nya halvledare**

t. ex: In:






och As



III IV V




					helium 2 He 4.0026
boron 5 B 10.811	carbon 6 C 12.011	nitrogen 7 N 14.007	oxygen 8 O 15.999	fluorine 9 F 18.998	neon 10 Ne 20.180
aluminium 13 Al 26.982	silicon 14 Si 28.086	phosphorus 15 P 30.974	sulfur 16 S 32.065	chlorine 17 Cl 35.453	argon 18 Ar 39.948
gallium 31 Ga 69.723	germanium 32 Ge 72.61	arsenic 33 As 74.922	selenium 34 Se 78.96	bromine 35 Br 79.904	krypton 36 Kr 83.80
indium 49 In 114.82	tin 50 Sn 118.71	antimony 51 Sb 121.76	tellurium 52 Te 127.60	iodine 53 I 126.90	xenon 54 Xe 131.29
thallium 81 Tl 204.38	lead 82 Pb 207.2	bismuth 83 Bi 208.98	polonium 84 Po [209]	astatine 85 At [210]	radon 86 Rn [222]
		ununquadium 114 Uuq [289]			



Vi doppar InAs med Si, vi får:

- A. N dopning
- B. P dopning
- C. Antingen N eller P dopning
- D. N och P dopning
- E. Si är grupp IV material. Därför stannar InAs odopad (dvs intrinsk)

boron 5 B 10.811	carbon 6 C 12.011	nitrogen 7 N 14.007
aluminium 13 Al 26.982	silicon 14 Si 28.086	phosphorus 15 P 30.974
gallium 31 Ga 69.723	germanium 32 Ge 72.61	arsenic 33 As 74.922
indium 49 In 114.82	tin 50 Sn 118.71	antimony 51 Sb 121.76
thallium 81 Tl 204.38	lead 82 Pb 207.2	bismuth 83 Bi 208.98



Vi doppar InAs med Si, vi får:

- A. N dopning
- B. P dopning
- C. Antingen N eller P dopning
- D. N och P dopning
- E. Si är grupp IV material. Därför stannar InAs odopad (dvs intrinsk)


boron 5 B 10.811	carbon 6 C 12.011	nitrogen 7 N 14.007
aluminium 13 Al 26.982	silicon 14 Si 28.086	phosphorus 15 P 30.974
gallium 31 Ga 69.723	germanium 32 Ge 72.61	arsenic 33 As 74.922
indium 49 In 114.82	tin 50 Sn 118.71	antimony 51 Sb 121.76
thallium 81 Tl 204.38	lead 82 Pb 207.2	bismuth 83 Bi 208.98

Det beror på vilken atom byter vi till Si:


Om vi byter **In** till **Si**, får vi en elektron till -> **N dopning**

Om vi byter **As** till **Si**, saknar vi en elektron mer-> **P dopning**


Resonant tunneling diod:



Kvantpricka som en artificiell atom:



$T = 250 \text{ mK to } 10 \text{ K}$





Kvantpricka som en artificiell atom:

Mer elektroner


..och så vidare

Två elektroner till det andra tillståndet:


Två elektroner till det Första tillståndet:



Lysdioder: dopning + spänning



Lysdioder: Bandgappet bestämmer vilken energi fotoner har



CdSe nanocrystals:


Små nanopartiklar, $d = 2 \text{ nm}$

Stora nanopartiklar, $d = 7 \text{ nm}$



Alla från samma material


Photoluminescence in a quantum dot: (no doping!)



Betrakta kvantbrunnen intill. Elektroner exciteras med fotoner med energi $hf > E_{g1}$.

Vid vilken energi förväntar du dig den starkaste ljusemissionen?


- A. $E_{\text{emission}} \approx E_{g2}$
- B. $E_{\text{emission}} \approx E_{g1}$
- C. $E_{\text{emission}} \approx E_{g2} + E_e + E_h$
- D. $E_{\text{emission}} \approx E_{g2} - E_e - E_h$
- E. $E_{\text{emission}} \approx E_e + E_h$



Betrakta kvantbrunnen intill. Elektroner exciteras med fotoner med energi $hf > E_{g1}$.

Vid vilken energi förväntar du dig den starkaste ljusemissionen?


- A. $E_{\text{emission}} \approx E_{g2}$
- B. $E_{\text{emission}} \approx E_{g1}$
- C. $E_{\text{emission}} \approx E_{g2} + E_e + E_h$
- D. $E_{\text{emission}} \approx E_{g2} - E_e - E_h$
- E. $E_{\text{emission}} \approx E_e + E_h$



- (1) Excitation följd av
- (2) Termalivering till lägsta möjliga energinivå (grundtillstånden för elektron och hål)
- (3) Spontan emission


Din uppgift är att välja ett material som blir en fin kvantprick som kan lysa i valfri synlig färg. Vilket material vill du helst ha i själva brunnen?

- A. GaN
- B. AlAs
- C. CdTe
- D. InSb



Din uppgift är att välja ett material som blir en fin kvantprick som kan lysa i valfri synlig färg. Vilket material vill du helst ha i själva brunnen?


- A. GaN
- B. AlAs
- C. CdTe
- D. InSb



CdTe's bandgap är precis under gränsen för synligt ljus. Med hjälp av kvantiseringseffekter i kvantbrunnen kan vi skapa ett effektivt bandgap som jag kan lägga valfritt inom det synliga området. (Se förra frågan). Detta efter kvantisering alltid ökar energin hos fotonen, inte miskar den

Lysdioder och lasrar:

Lysdiod (Light-Emitting Diode = LED)



LASER

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation



<https://www.osram.se/os/>

- välriktad
- monokromatisk (~en våglängd)
- koherent strålning

Kvantiserade tillstånd hos fotoner:

$\lambda/2 = 10$ mm mikrovågresonator: $f_1 = 6$ GHz, $E_1 = 25$ ueV

